

SOMMAIRE

- Effet des fumures organiques et d'association des cultures sur les propriétés des sols et la sécrétion de la glomaline dans un champ de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) dans la zone de Saguia à NiameyP. 1-11
- Perception et pratiques des producteurs de manioc (*Manihot esculenta* Crantz) sur la gestion de la fertilité des sols dans la vallée du Niari, district de Loudima au Congo-BrazzavilleP. 12-20
- Construction du Port Autonome de Kribi et des infrastructures connexes : impacts environnementaux, marginalisation des pygmées et défis de justice environnementale.....P. 21-43
- Effets des pratiques de gestion de la fertilité sur les caractéristiques physico-chimiques des sols dans les plaines rizicoles du sud du Tchad.....P. 44-51
- Trends in scientific research on coastal lagoon ecosystem services: A bibliometric analysis.....P. 52-66
- Facteurs socioéconomiques du choix des modes de traitements de l'hépatite B dans les zones sanitaires de Parakou-N'Dali et Tchaourou au Nord du BéninP. 67-76
- Influence de la méthode de semis sur l'aspect et le taux de survie des boutures de *Myrianthus arboreus* (P. Beauv) après bourgeonnement (Daloa, Côte d'Ivoire)P. 77-85
- Influence of agroforestry system based on cocoa tree on the physico-chemical properties of soils of the Luki Biosphere Reserve in the Democratic Republic of CongoP. 86-94
- Rôle de la célébrité marketing dans l'adoption du comportement écologique des consommateurs de la commune de Nanza à Matadi (Kongo central)P. 95-99
- Effets comparés de la fiente de poules et de l'engrais minéral NPK 17-17-17 sur la culture de riz (*Oriza sativa*, variété Nerica 4) dans les conditions agroécologiques de BomaP. 100-105
- Caractérisations pétrographique, géochimique et minéralogique de la plage bauxitique Kimvela du Kongo central en République Démocratique du CongoP. 106-121

Les opinions émises et la forme utilisée sont sous la responsabilité des auteurs